

N10.02 Vochtig Hooiland



Beschrijving

Overgangen naar grote zeggenvegetaties en ruigten met moerasspirea komen voor in vochtige hooilanden. Daarnaast kan er lokaal opslag van wilgenstruwelen zijn. Deze elementen zijn van belang voor struweelvogels en insecten. Voor weidevogels zijn open landschappen van belang. Belangrijke gebieden met vochtig hooiland zijn in de Noardlike Fryske Wâlden te vinden in het veenweidegebied. Kenmerkende subtypes in Noardlike Fryske Wâlden zijn:

- **Langdurig natte hooilanden.**
Meestal hebben deze hooilanden 's winters water op maaiveld, dat tot ver in het voorjaar blijft staan. In de zomer drogen deze slechts oppervlakkig uit. De bodem is vaak moerig (veen), of kleiig of zavelig (al dan niet op veen). Soorten die hier voorkomen zijn: grote zegge, waterkruiskruid, waterdrieblad, holpijp, rietorchis, gevleugeld hertshooi en de gewone dotterbloem.
- **'s Winters natte hooilanden.**
Meestal hebben deze hooilanden 's winters water op of aan maaiveld. In de zomer drogen ze doorgaans iets dieper uit dan voorgaande type. De bodem betreft vaak een zandgrond (beekeerdgrond), maar kan ook kleiig, moerig of zavelig (al dan niet op veen) zijn. Soorten die hier voorkomen zijn onder andere moerasstreekzaad, bosbies, veldrus, brede orchis, waterkruiskruid en veel van de soorten uit het voorgaande type.

Beheereisen

- Bij het maaien van vochtige hooilanden gaat het om het eenmalig tot enkele keren maaien, waarbij het maaisel altijd volledig wordt afgevoerd.
- Na beweiding is het begrazen van het terrein nadat het gehooit is. U kunt nabeweiden als het gewas te weinig productief is voor een tweede maaibeurt, maar nog te productief om zonder beheer kort de winter in te gaan. Hierdoor voorkomt u dat de grasmat vervilt en verruiging optreedt. De productiviteit van het grasland wordt beïnvloed door de voedselrijkdom en de tijd dat het grasland onder water staat (of het water zich hoog in de wortelzone bevindt). Onder zeer natte omstandigheden in het voorjaar zal de gewasgroei traag op gang komen.
- Het bemesten met ruige stalmest, max. 20 ton per ha per jaar. In de meeste gevallen zal mesttoediening eens in de 3 jaar voldoende zijn.
- Het incidenteel toedienen van kalk of kalkhoudende stoffen, om verzuring tegen te gaan.
- Het verwijderen van opslag is het weghalen van boom- en struikvormende soorten. Daarmee voorkomt u dat de lage vegetatie wordt overwoekerd door bomen en struiken of dat het landschap te besloten wordt.

Beheervoorschriften

- Algemeen: De intensiteit van het beheer moet worden afgestemd op de vegetatieproductie, voedselrijkdom en de aanwezige weidevogels.
- Bij bemesten betreft het ruige mest zonder plastic en andere materialen die hier niet in thuishoren. Indien ruige stalmest niet voor handen is kan in overleg met de Vereniging gezocht worden naar een andere mogelijkheid.
- Zorg voor jaarlijks greppelonderhoud.
- Indien er sprake is van witboldomnantie of aanwezigheid van veel pitrus, dit doorbreken met tijdelijk aangepast beheer.
- Beweiding: voorkeur voor extensieve beweiding: extensief= 1-1,5 GVE/ha. In overleg met de Vereniging kan hier met goede redenen van afgeweken worden.
- Wanneer gemaaid wordt, let op broedende vogels maai gefaseerd met kuikenstroken bij de aanwezigheid van alarmerende vogels. Streef naar afwisseling van vorm en tijdstip van beheer.
- Maai van binnen naar buiten en maai 's nachts niet.

N.B. Het kan zijn dat niet alle beheervoorschriften voor iedere beheerder gelden of dat specifieke voorschriften voor een gebied nodig zijn. Hierover kan afstemming plaatsvinden met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.