

## N13.01 Vochtig Weidevogelgrasland



### Beschrijving

Een kenmerk van weidevogelgraslanden is het open karakter met brede rijkbegroeide slootkanten. Voor goede weidevogelgebieden is het van belang dat er een mozaïek van diverse vormen van graslandbeheer is, denk aan diversiteit aan beweiding, maaidata, plasdras etc. Andere belangrijke factoren zijn een rijke en bereikbare bodemfauna en insectenrijkdom ('kuikengrasland'). Kenmerkende soorten voor deze gebieden zijn: Grutto, Scholekster, Kievit, Tureluur, Slobeend en Zomertaling.

Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk jonge weidevogels slachtoffer worden van beheermaatregelen wordt het maai- en graasbeheer afgestemd op de weidevogels. Van belang voor de biodiversiteit zijn ook de heel laat gemaaide delen (na 1 augustus), hier hebben laat broedende soorten van belang bij, als de Kwartel, Kwartelkoning en diverse zangvogels.

**Voorbeeld:** Een **optimaal mozaïek** op een totaaloppervlak van 100 hectare kan als volgt worden beschreven:

- Maximaal 25% seizoen standweiden 2,5 GVE/ha (rundvee)
- 10% voorweiden < 01/07
- Gespreide maaidata
- Over max. 75 m1 perceel breedte zelfde maaidatum
- 75 à 85% oppervlakte ( zo nodig jaarlijks) bemesten met ruige stalmest (10-20 ton/ha)
- 2 plas-dras; totaal minimaal 2 ha / 100 ha
- 4 greppel plas-drassen; totaal minimaal 2 ha / 100 ha
- 2-5% van de oppervlakte moet bestaan uit water in het maaiveld van eind januari tot begin april

### Beheervoorschriften

- Algemeen: De intensiteit van het beheer moet worden afgestemd op de vegetatieproductie, voedselrijkdom en de aanwezige weidevogels.
- Regelmatig bemesten met ruige mest om het bodemleven en daarmee het aanbod van voedsel te verzorgen voor de weidevogels, het liefst 10-20 ton/ha (ideaal is een pH tussen 5,0 en 5,8). Het betreft ruige mest zonder plastic en andere materialen die hier niet in thuishoren. Indien ruige mest niet voor handen is kan in overleg met de Vereniging gezocht worden naar een andere mogelijkheid.
- Het incidenteel toedienen van kalk of kalkhoudende stoffen, om verzuring tegen te gaan.
- Zorg voor jaarlijks greppelonderhoud.
- Vernatting aanbrengen ten behoeve van de weidevogels in het voorjaar en/of de zomerperiode is een mogelijkheid.
- Indien er sprake is van witboldomnantie of aanwezigheid van veel pitrus, dit doorbreken met tijdelijk aangepast beheer.



- Wanneer gemaaid wordt, let op broedende vogels maai gefaseerd met kuikenstroken bij de aanwezigheid van alarmerende vogels. Streef naar afwisseling van vorm en tijdstip van beheer
- Maai van binnen naar buiten en maai 's nachts niet
- Extensieve beweiding afgestemd op de vegetatiedichtheid en weidevogels. Beweiding: voorkeur voor extensieve beweiding: extensief= 1-1,5 GVE/ha. In overleg met de Vereniging kan hier met goede redenen van afgeweken worden.

N.B. Het kan zijn dat niet alle beheervoorschriften voor iedere beheerder gelden of dat specifieke voorschriften voor een gebied nodig zijn. Hierover kan afstemming plaatsvinden met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.